

CONTRACCETTIVI ORMONALI SISTEMICI E AUMENTO DEL RISCHIO TROMBOTICO

ETINILESTRADIOLO/DROSPIRENONE: AUMENTA IL RISCHIO DI TROMBOSI VENOSA PROFONDA

A seguito della pubblicazione di due ampi studi epidemiologici, che hanno valutato il rischio di trombosi venosa profonda associato con l'uso dei contraccettivi orali combinati (COC) contenenti drospirone come progestinico (Aliane®, Yarina®, Yasmin®, Yasminelle®, Yaz®), l'Agenzia regolatoria tedesca (BfArM), insieme ad altri Paesi europei, ha avviato una revisione sul rischio di tromboembolismo correlato all'uso di questi medicinali.

I COC a base di drospirone sono attualmente in revisione anche da parte dell'Agenzia regolatoria svizzera (Swissmedic) in seguito alla segnalazione di **1 decesso per embolia polmonare dopo 10 mesi di assunzione di Yaz®**, entrato in commercio in Italia nei primi mesi del 2009 e il cui rischio trombotico al momento dell'autorizzazione non era noto.

Negli Stati Uniti, sono in corso cause legali nei confronti della ditta produttrice di Yaz® a causa di eventi avversi quali calcolosi biliare, trombosi venosa profonda ed embolia polmonare.

Queste nuove evidenze comportano la necessità di un aggiornamento del documento della Conferenza Nazionale di Consenso sulla prevenzione delle complicanze trombotiche associate all'uso di estroprogestinici del settembre 2008, in cui l'incidenza del rischio trombotico da drospirone veniva definita sovrapponibile a quella da levonorgestrel.

Fonte: Dialogo sui farmaci • n. 1/2010