

Enbrel ed infezioni polmonari e disseminate

ENBREL : INFEZIONI

Amgen Canada in collaborazione con Health Canada, ha modificato le sezioni Boxed Warnings and Precautions della monografia del prodotto, includendovi l'istoplasmosi.

Nella sorveglianza postmarketing, sono state segnalate gravi infezioni polmonari e infezioni disseminate (istoplasmosi, coccidioidomicosi, blastomicosi), talvolta ad esito fatale, nei pazienti trattati con i bloccanti del TNF-alfa, tra cui Enbrel.

Per i pazienti che stanno assumendo un inibitore del TNF-alfa e che presentano segni e sintomi di malattia sistemica, come febbre, malessere, perdita di peso, sudorazioni, tosse, dispnea, e/o presentano infiltrati polmonari, i medici devono accertarsi del rischio potenziale di infezioni micotiche endemiche. In caso affermativo, è raccomandato un trattamento antifungino empirico; l'impiego dell'inibitore del TNF-alfa dovrebbe essere sospeso fino ad accertamento diagnostico e dopo trattamento adeguato dell'infezione.

Il trattamento con gli inibitori del TNF-alfa può essere ripreso dopo risoluzione dell'infezione, valutando i rischi e i benefici della terapia.

Fonte: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/2009/enbrel_hpc-cps-eng.php , Health Canada 22 aprile 2009