

FLUTAMIDE e Gravi Reazioni Epatiche

FLUTAMIDE : Gravi Reazioni Epatiche

La flutamide (FLUPROST, ELEUXIN) è indicata per il trattamento del carcinoma prostatico in stadio avanzato sia di pazienti non precedentemente sottoposti ad alcuna terapia specifica sia di quelli che non hanno risposto o che sono divenuti refrattari al trattamento ormonale. Nella Nuova Zelanda il farmaco è anche utilizzato per il trattamento dei disordini associati ad iperandrogenismo nelle donne e di recente è stato segnalato il caso di una donna che, a seguito del trattamento con flutamide, ha riportato un'insufficienza epatica subacuta con progressione verso l'encefalopatia. La funzionalità epatica è stata deteriorata in modo irreversibile.

In letteratura sono riportati casi di severe reazioni epatiche e in scheda tecnica è già presente una specifica avvertenza. Nella sezione "avvertenze speciali e precauzioni d'impiego", l'insufficienza epatica è riportata come usualmente reversibile dopo interruzione della terapia ed in qualche paziente, dopo riduzione della posologia.

Questa segnalazione serve a ricordare il potenziale rischio di gravi reazioni epatiche associate all'uso di questo farmaco e la necessità, già indicata in scheda tecnica, di monitorare gli enzimi epatici.

Fonte: <http://www.medsafe.govt.nz/profs/PUarticles.asp>, Medsafe febbraio 2010